


NACHBEHANDLUNG METATARSALGIE– MINIMALINVASIVE MITTELFUSSKÖPFCHENDURCHTRENNUNG (DMO)


Tag nach OP	Wunde	Hilfsmittel	Medikamente	Belastung/ Verhalten
<b>0-12</b>	- zwei bis dreitägige Pflasterwechsel - noch kein Duschwasserkontakt	- Verbandsschuh - Gehstützen	- Ibuprofen 600mg - Novaminsulfon 500mg - Thromboseprophylaxe	- Vollbelastung gestattet - bei Zeiten mehrfach am Tag Hochlagern des Beines - mehrfach tägliches Kühlen des Fußes - Fortbewegung mit dem Verbandsschuh!!
<b>13/14</b>	- Fadenzug - bei gesicherter Wundheilung (geschlossene Wundverhältnisse ohne Nässen) Duschwasserkontakt möglich	Verbandsschuh	- bei Bedarf noch Schmerzmitteleinnahme - weiterhin Thromboseprophylaxe	- weitere Krankenschreibung einholen - noch abschwellende Maßnahmen - Physio: ggfs. Start einer Lymphdrainage
<b>bis 3. Woche</b>		Verbandsschuh bei Schwellung oder Übergang auf Konfektionsschuh	- bei Bedarf noch Schmerzmitteleinnahme	- RÖNTGENKONTROLLE in der Praxis - falls zeitgerechte knöcherne Durchbauung Übergang auf Vollbelastung im Konfektions-Schuh möglich nach Fadenzug wäre ein Übergang auf einen weiten, - Physio: Gangschule



## NACHBEHANDLUNG METATARSALGIE– MINIMALINVASIVE MITTELFUSSKÖPFCHENDURCHTRENUNG (DMO)

In den ersten beiden Wochen nach OP stehen abschwellende Maßnahmen im Vordergrund wie mehrfach tägliches Kühlen des gesamten Fußes und tägliches Hochlagern des Beines. Hierzu sollte bei Verträglichkeit und guter Nierenfunktion auch Ibuprofen oder vergleichbare Medikamente nach Plan eingenommen werden. Das Pflaster sollte alle zwei bis drei Tage gewechselt werden, entweder durch die hausärztlichen Kollegen oder durch den Patienten selbst. Direkter Wasserkontakt sollte vermieden werden. In dieser Zeit einer eher geringen Mobilisation ist eine tägliche Thromboseprophylaxe („Bauchspritze“) erforderlich. Bei Fortbewegung sollte der Verbandsschuh konsequent bis zur 4. Woche nach OP getragen werden – eine Vollbelastung ist gestattet. Eine explizite Physiotherapie wird in der Regel nicht erforderlich sein.

Um den 12. Tag nach OP können die Hautfäden entfernt werden, dann darf auch bei gesicherter Wundheilung Duschwasserkontakt bestehen. Eine Thromboseprophylaxe ist dann in der Regel auch nicht mehr erforderlich (bei Risikofaktoren wird diese aber fortgesetzt). Bei Bedarf können noch schmerzstillende Medikamente weiter eingenommen werden. Vier Wochen nach OP wird eine Röntgenkontrolle in der Praxis entscheiden, ob auf einen bequemen Konfektions-Schuh wieder übergegangen werden kann.



## NACHBEHANDLUNG METATARSALGIE– MINIMALINVASIVE MITTELFUSSKÖPFCHENDURCHTRENUNG (DMO)

Bitte beachten Sie folgendes:

- Selbstständiges Autofahren ist bei angelegtem Verbandsschuh(bis zur 4. Woche nach OP) verkehrsrechtlich NICHT erlaubt.
- Lymphdrainagen sind in der Rezeptierung leider streng limitiert und kommen nur nach Absprache zum Einsatz.
- Die hausärztlichen KollegInnen erhalten einen Entlassbericht. Sie können sich dort zum Verbandswechsel und Fadenzug ebenso vorstellen.
- Die Dauer und Dosis der Thromboseprophylaxe wird mit Ihnen individuell abgesprochen.
- Vollbelastung ist gestattet. Wenn Sie sich sicher fühlen brauchen Sie keine Gehstützen mitzuführen.
- Sie können im Vorfeld der Operation das Gespräch mit unseren Narkoseärzten in der Wolfartklinik suchen – dort wird entschieden, ob Sie eine hausärztliche OP-Vorbereitung brauchen. Damit sparen Sie sich Zeit und Ressourcen.
- Schwellungen sind bis zum 3. Monat nach OP normal – keine Sorge – in der Regel schwillt der Fuß auch schneller ab.
- Leichte sportliche Betätigung ab der 10. Woche nach OP.
- Sollte es im Rahmen der Nachbehandlung zu Wundheilungsstörungen oder anderen Unsicherheiten kommen, zögern Sie nicht Kontakt zu mir aufzunehmen, am besten per Email: [info@orthopraxis-grafelfing.de](mailto:info@orthopraxis-grafelfing.de).

Das hier veröffentlichte Nachbehandlungsschema schildert einen komplikationslosen Verlauf nach OP und wird bei Bedarf immer an den individuellen Zustand des Patienten angeglichen. Das Nachbehandlungsschema ist ebenso an die oben genannte OP angepasst und ggf. auch nicht auf das Vorgehen anderer Operateure übertragbar.

